

Soutien n° 11 : Limites - Continuité**Exercice 1 :**

Étudier les limites suivantes :

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(5x)} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^7 + 4x + 1}{3x^7 + x^9 + 3} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2x) - \cos(x)}{x - \frac{\pi}{2}} & \text{d) } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x| - 2}{x^2 - 4} \\ \text{e) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 2x - 1}{x^3 - x^2 + x - 1} & \text{f) } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^3 - 1} - \frac{2}{x^2 - 1} \right) & \text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(x)}{1 - \cos(x)} \end{array}$$

Exercice 2 :

Déterminer un équivalent "simple" en a de la fonction f donnée :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = \frac{x^2 + 1}{\sin^2(x)} \text{ avec } a = 0; & \text{b) } f(x) = \frac{(\cos(x) + 1)^2}{(\cos(x) - 1)^2} \text{ avec } a = 0 \\ \text{c) } f(x) = \ln(3x^2 - x + \sqrt{x}) ; & a = 0 \text{ puis } a = +\infty \end{array}$$

Exercice 3 :

- Comparer au voisinage de $+\infty$ les fonctions suivantes : a) $f(x) = x^a$ et $g(x) = a^x$ avec $a > 1$;
b) $f(x) = x^{\ln(x)}$ et $g(x) = (\ln(x))^x$; c) $f(x) = (x^x)^x$ et $g(x) = x^{x^x}$.
- Comparer au voisinage de 0 les fonctions suivantes : a) $f(x) = (e^x - 1)^2$ et $g(x) = x \sin(x)$;
b) $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ et $g(x) = x^3$; c) $f(x) = \ln(x) \ln(1 + x)$ et $g(x) = \ln^2(x) \sin^2(x)$.

Exercice 4 :

On note $[x]$ la partie entière du réel x .

- Montrer que $[x] \underset{+\infty}{\sim} x$. A-t-on $e^{[x]} \underset{+\infty}{\sim} e^x$?
- Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{[x]}) = 0$. En déduire que : $e^{\sqrt{[x]}} \underset{+\infty}{\sim} e^{\sqrt{x}}$.

Exercice 5 :

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par : $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = 3x + \frac{|2x|}{x}$ et $f(0) = 2$.

Étudier la continuité de f en 0 et donner une représentation graphique de f dans un repère orthonormé.

Exercice 6 :

- Déterminer un prolongement par continuité en $x_0 = 1$ de la fonction $f : x \mapsto \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$.
- Soit h la fonction définie sur \mathbb{R}^* par $h(x) = \text{Arc tan} \left(\frac{1}{x} \right)$. Étudier la continuité de h sur \mathbb{R}^* . Peut-on prolonger h par continuité en 0 ?

Exercice 7 :

Soit $p \in]0, 1[$ et $q = 1 - p$. Montrer que l'équation : $x^2 - qx - pq = 0$ d'inconnue x admet deux racines réelles distinctes, notées r et s , vérifiant : $-1 < r < 0 < s < 1$.

Exercice 8 :

Montrer que l'équation $e^{-x^2} = x$ admet une unique solution dans \mathbb{R}^{+*} .

Exercice 9 :

Pour $\lambda \in \mathbb{R}^+$, on pose $P_\lambda(x) = x^3 + \lambda x - 1$.

- Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^+$, la fonction P_λ a une unique racine réelle notée $u(\lambda)$.
- Montrer que la fonction $\lambda \mapsto u(\lambda)$ est monotone et continue sur \mathbb{R}^+ , puis déterminer ses limites en 0 et $+\infty$.