

TD n° 14 : ContinuitéExercice 1

Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  vérifiant :  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ .  
Démontrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

Exercice 2

Soit  $f$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$ , telle que :  $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) + f(x) = 0$ .

a) Calculer  $f(0)$ .

b) Démontrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , et pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = (-1)^n f(x)$ .

c) Démontrer que  $f$  est la fonction nulle.

Exercice 3

Soit  $f_n$  la fonction définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$  par :  $f_n(x) = \frac{\ln(|x|^n)}{x^n - 1}$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ).

Montrer que  $f_n$  admet un prolongement par continuité sur  $\mathbb{R}^*$ .

Exercice 4

Étudier la continuité sur  $\mathbb{R}$  de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{e^{1/x} + 1}$  si  $x \neq 0$  et  $f(0) = 0$ .

Exercice 5

Déterminer toutes les fonctions  $f$ , continues sur  $\mathbb{R}$ , telles que :  $\forall x \in \mathbb{R}, [f(x)]^2 = f(x)$ .

Exercice 6

Montrer :  $\forall x \in ]1, e], \exists ! y \in [e, +\infty[$  tel que  $x^y = y^x$ .

On pose  $y = g(x)$ . Montrer que  $g : ]1, e] \rightarrow [e, +\infty[$  est strictement décroissante.

Quelle est la limite de  $g(x)$  quand  $x$  tend vers  $1^+$  ?

Exercice 7

Soit  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction croissante telle que  $g : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$  soit décroissante. Montrer que  $g$  est continue. Qu'en est-il pour  $f$  ?

Exercice 8

Soit  $f$  une fonction continue sur  $[0, 1]$  telle que  $f(0) = f(1)$ .

Montrer qu'il existe un nombre réel  $c \in [0, \frac{1}{2}]$  tel que  $f(c) = f(c + \frac{1}{2})$ .

Exercice 9

Soit  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  continue, positive et telle que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell < 1$ .

Montrer qu'il existe  $\alpha \in [0, +\infty[$  tel que  $f(\alpha) = \alpha$ .

Exercice 10

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, a_2, \dots, a_n$   $n$  nombres réels 2 à 2 distincts dans l'intervalle  $[0, 1]$ . On

définit la fonction  $f_n$  sur  $[0, 1]$  par :  $\forall x \in [0, 1], f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x - a_k|$ . Que représente  $f_n(x)$  ?

Calculer  $f_n(0) + f_n(1)$  et en déduire qu'il existe au moins un réel  $u \in [0, 1]$  tel que :  $f_n(u) = \frac{1}{2}$ .

Exercice 11

On suppose que la fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et que  $\lim_{+\infty} f = a \in \mathbb{R}, \lim_{-\infty} f = b \in \mathbb{R}$ .

Montrer que  $f$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

## Indications pour les exercices du TD n° 14

Ex. 1 : traiter le cas  $k = 0$  puis, pour  $k \neq 0$ , revenir à la définition avec  $(\varepsilon, \alpha)$  pour montrer  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  ou utiliser le théorème des "gendarmes".

Ex. 2 : a) faire  $x = 0$  ; b) récurrence ; c) utiliser la continuité de  $f$  en 0 pour passer à la limite dans l'égalité du b).

Ex. 3 : étudier les limites de  $f$  en 0, en 1 puis en  $-1$  en distinguant, pour ce dernier cas, les valeurs de  $n$  selon leur parité.

Ex. 4 : étudier la continuité en 0 en distinguant limite à droite et limite à gauche.

Ex. 5 : montrer que  $f(\mathbb{R}) = \{0, 1\}$  puis conclure à l'aide de la continuité de  $f$ .

Ex. 6 : transformer l'équation en introduisant la fonction  $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$  ; utiliser les restrictions de  $f$  à  $]1, e]$  et  $[e, +\infty[$ .

Ex. 7 :  $g$  admet des limites à droite et à gauche en tout point  $a > 0$ , en déduire les limites à droite et à gauche de  $f$  en  $a$  puis conclure.

Ex. 8 : introduire la fonction  $g : x \mapsto f(x) - f(x + \frac{1}{2})$  et regarder ses valeurs aux bornes de son domaine.

Ex. 9 : étudier  $x \mapsto f(x) - x$  et montrer qu'elle prend des valeurs de signes contraires.

Ex. 10 : utiliser la positivité de  $f_n$  pour justifier que les 2 nombres  $f_n(0)$  et  $f_n(1)$  encadrent  $\frac{1}{2}$ .

Ex. 11 : utiliser la définition des limites avec par exemple  $\varepsilon = 1$  pour montrer que  $f$  est bornée sur des voisinages de  $+\infty$  et  $-\infty$ , puis utiliser la continuité sur un segment.

## Indications pour les exercices du TD n° 14

Ex. 1 : traiter le cas  $k = 0$  puis, pour  $k \neq 0$ , revenir à la définition avec  $(\varepsilon, \alpha)$  pour montrer  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$  ou utiliser le théorème des "gendarmes".

Ex. 2 : a) faire  $x = 0$  ; b) récurrence ; c) utiliser la continuité de  $f$  en 0 pour passer à la limite dans l'égalité du b).

Ex. 3 : étudier les limites de  $f$  en 0, en 1 puis en  $-1$  en distinguant, pour ce dernier cas, les valeurs de  $n$  selon leur parité.

Ex. 4 : étudier la continuité en 0 en distinguant limite à droite et limite à gauche.

Ex. 5 : montrer que  $f(\mathbb{R}) = \{0, 1\}$  puis conclure à l'aide de la continuité de  $f$ .

Ex. 6 : transformer l'équation en introduisant la fonction  $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$  ; utiliser les restrictions de  $f$  à  $]1, e]$  et  $[e, +\infty[$ .

Ex. 7 :  $g$  admet des limites à droite et à gauche en tout point  $a > 0$ , en déduire les limites à droite et à gauche de  $f$  en  $a$  puis conclure.

Ex. 8 : introduire la fonction  $g : x \mapsto f(x) - f(x + \frac{1}{2})$  et regarder ses valeurs aux bornes de son domaine.

Ex. 9 : étudier  $x \mapsto f(x) - x$  et montrer qu'elle prend des valeurs de signes contraires.

Ex. 10 : utiliser la positivité de  $f_n$  pour justifier que les 2 nombres  $f_n(0)$  et  $f_n(1)$  encadrent  $\frac{1}{2}$ .

Ex. 11 : utiliser la définition des limites avec par exemple  $\varepsilon = 1$  pour montrer que  $f$  est bornée sur des voisinages de  $+\infty$  et  $-\infty$ , puis utiliser la continuité sur un segment.